

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 7 - 8 - 69 953803

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE,
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture
Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 1 au Bulletin Technique N° 107 d'Août 1969

1969-25

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou : Le beau temps chaud et sec de juillet n'a pas permis l'extension des foyers de Mildiou. Si dans quelques vignobles les taches sont assez nombreuses, elles sont très rares ailleurs.

Néanmoins, en raison de la végétation toujours active, un traitement devrait être appliqué dès à présent pour éviter les invasions tardives.

Black-Rot : Le traitement conseillé ci-dessus sera également valable contre le Black-Rot. Il préviendra les attaques sur les grappes.

Cicadelle (*Empoasca flavescens*) : Les pullulations larvaires atteignent localement le seuil d'alerte (80 à 100 larves pour 100 feuilles). En conséquence dans les parcelles habituellement infestées, appliquer une pulvérisation insecticide à base de l'une des matières actives ci-dessous :

- D.D.T.	75 grs	M.A./Hl.
- Carbaryl	75 grs	M.A./Hl.
- Azinphos	40 grs	M.A./Hl.
- Formothion	50 grs	M.A./Hl.
- Diméthoate	30 grs	M.A./Hl.
- Oxydéméton méthyl	25 grs	M.A./Hl.

Ce traitement pourra être sans inconvénient effectué en même temps que l'application fongicide destinée à combattre le Mildiou.

Araignée rouge (*Panonychus ulmi*) : Une nouvelle génération, parfois importante se multiplie dans certains vignobles du Médoc, du Blayais et du Bourgeais et les premiers symptômes sont observés sur le feuillage (feuilles plombées). Il est donc recommandé de surveiller attentivement les vignes de ces régions et d'intervenir dès qu'apparaissent les premiers dégâts avec un acaricide actif à la fois sur les oeufs, les larves et les adultes.

.../...

P 360

.../...

INFORMATIONS

Araignée jaune (*Eotetranychus carpini*) : Les pullulations ne progressent que très lentement et par petits foyers isolés.

Poursuivre la surveillance des vignobles et intervenir dès l'apparition de symptômes le long des nervures des feuilles (petites mosaïques rouges sur les cépages rouges, et jaunissement sur les cépages blancs).

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des Pommes : Appliquer un nouveau traitement dès à présent.

Carpocapse des Prunes : Dans certains vergers mal protégés, les dégâts de carpocapse dépassent une centaine de fruits par arbre et progressent rapidement. Outre les dégâts directement occasionnés par le ravageur, la présence de ces fruits gommeux peut favoriser l'installation du monilia. Il est donc recommandé d'effectuer immédiatement une dernière pulvérisation insecticide.

Tordeuse orientale : Le vol de papillons est important depuis une dizaine de jours. Assurer la protection des variétés de pêches tardives en tenant compte des délais légaux d'utilisation des insecticides avant la récolte.

Bordeaux, le 5 Août 1969

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chargé des Avertissements Agricoles
C. ROUSSEL

Pour l'Inspecteur de la Protection
des Végétaux et p/ i.
M. LARGE -